



Alimentos Balanceados

Plan para Destete Precoz en Ganado de Carne sobre campo mejorado

Alimento	Dia	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 - 45	46 - 120	Etapa	Duración
RACSAL AP INI 19%	Kg/dia	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80	1,00	1,20	1,20	1,20			Corral *	10 días
RACSAL AP DP 16%	Kg/dia									**	**	1,50		Campo o pradera	35 días
RACSAL RECRÍA CL 16%	Kg/dia												1 al 1,5% PV	Campo o pradera	74 días
AGUA		a voluntad													
FORRAJE (fardo)		si	Optativo.	Optativo.											

Apuntes:

* en la etapa de Corral el alimento debe darse dividido en 2 tomas, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde.

** si decide cambiar a RACSAL DP 16% al salir del potrero, deberá mezclar durante 2 días con la ración anterior como adaptación al cambio.

*** Una vez logrado el objetivo deseado, puede continuar la recría del ternero con RACSAL RECRÍA CL

**** Al finalizar la suplementación deberá hacer una disminución de la cantidad de ración por al menos 3 días.

Manejo del alimento

Almacenar en su envase original, cerrado, evitando la humedad y el excesivo calor, en lugar fresco y bien ventilado. Al proporcionar la ración en los comederos, verificar que no estén mojados. Siempre deberá eliminar restos de ración de la suplementación anterior. Con estas simples medidas de higiene, se evitará la aparición de hongos que provocan alteraciones digestivas en los terneros y retrasan las ganancias de peso. Este alimento está formulado para que el animal logre ganancias de peso reales y lógicas siempre que se respeten las indicaciones de manejo y cantidades a suministrar